

JT
12/6/97 204
Koyapó 324

INDIOS

Vírus HTLV 2 é endêmico nos caiapós do Pará

A nação indígena Caiapó é a comunidade que apresenta os maiores índices de contaminação pelo vírus HTLV 2, que é sexualmente transmissível e pode causar paralisia. Como o vírus HIV da aids, o HTLV é um retrovírus, que necessita de enzimas específicas para atacar as células.

las. A informação consta de estudo coordenado pelo professor Ricardo Ishak, da Universidade Federal do Pará, e apresentado ontem na Conferência sobre Retrovirologia Humana realizada no Rio. A pesquisa constatou que 32,3% dos índios caiapós de seis diferentes tribos são portadores do HTLV 2.

"É o primeiro foco endêmico do HTLV 2 que encontramos nas Américas", afirmou Ishak. A presença do HTLV 1, tipo mais agressivo do vírus, que pode causar leucemia e doenças do sistema nervoso, também foi de-

tectada, porém em menor grau. Segundo os pesquisadores, o HTLV 2 estaria presente entre esses índios há mais de 30 mil anos, o que os teria tornado resistentes a ele, pois só foi encontrado um caso em que houve desenvolvimento de sintomas. O vírus pode ser muito mais destrutivo para populações não-indígenas.

Entre os caiapós, o vírus foi detectado em 64% dos adultos entre 40 e 49 anos e sua presença se explica pelo costume tribal de manter relações sexuais com diferentes parceiros.