

Anexo 16

Registros de mamíferos de grande e médio porte obtidos na GLEBA 2 através de dados secundários do Parque Florestal do Itapetinga obtidos de Zimbres-Silva F (2008) e Giaretta KGF (2002). Categorias de status de ameaça VU vulnerável, LC least concern, NT próximo a ameaça, DD deficiente de dados.

Ordem	Família	Espécie	Nome popular	São Paulo (2008)	IBAMA (2003)	IUCN (2009)
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Didelphis aurita</i>	Gambá-de-orelha-preta			LC
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Didelphis albiventris</i>	Gambá-de-orelha-branca			LC
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Philander frenatus</i>	cuica-quatro-olhos			
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Metachirus nudicaudatus</i>	Cuíca-quatro-olhos	NT		
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Marmosops incanus</i>	Cuíca	NT		
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Micoureus demerarae</i>				LC
Xenarthra	Dasypodidae	<i>Dasybus novemcinctus</i>	tatu-galinha			LC
Xenarthra	Dasypodidae	<i>Eupharactus sexcinctus</i>	tatu-peba			LC
Primates	Pitheciidae	<i>Callicebus nigrifrons*</i>	Sauá	NT		NT
Primates	Cebidae	<i>Callithrix aurita*</i>	sagui-da-serra-escuro	VU	VU	VU
Carnívora	Felidae	<i>Puma yagouaroundi</i>	Gato-mourisco			LC
Carnívora	Felidae	<i>Puma concolor</i>	Onça-parda	VU	VU	LC
Carnívora	Felidae	<i>Leopardus pardalis</i>	Jaguetrica	VU	VU	LC
Carnívora	Felidae	<i>Leopardus tigrinus</i>	gato-do-mato-pequeno	VU	VU	VU
Carnívora	Mustelidae	<i>Eira bárbara</i>	Irara			LC
Carnívora	Mustelidae	<i>Galictis cuja</i>	Furão	DD		LC
Carnívora	Canidae	<i>Cerdocyon thous</i>	cachorro-do-mato			LC

Carnívora	Procyonidae	<i>Nasua nasua</i>	Quati			LC
Carnívora	Procyonidae	<i>Procyon cancrivorus</i>	mão-pelada			LC
Artiodactyla	Cervidae	<i>Mazama americana</i>	veado-mateiro	VU		DD
Rodentia	Caviidae	<i>Cavia aperea</i>	Preá			LC
Rodentia	Erethizontidae	<i>Sphiggurus villosus</i>	Ouriço			LC
Lagomorpha	Leporidae	<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	Tapeti			LC

* espécies endêmicas da Mata Atlântica.

Registros de mamíferos de grande e médio porte obtidos na GLEBA 2 através de dados primários: Registros diretos: RV - rastros ou vestígios, VS – visualização, VO – vocalização, AF – armadilha fotográfica. Categorias de status de ameaça VU vulnerável, LC least concern, NT próximo a ameaça, DD deficiente de dados.

Ordem	Família	Espécie	Nome popular	Tipo de registro	São Paulo (2008)	IBAMA (2003)	IUCN (2009)	Sítio Amostral
Xenarthra	Dasyopidae	<i>Dasyopus sp</i>	Tatu	RV				2
Primates	Pitheciidae	<i>Callicebus nigrifrons</i>*	Sauá	VS, VO	NT		NT	1,2
Primates	Atelidae	<i>Alouatta clamitans</i>*	Bugio-ruivo	VS		NT		1
Carnívora	Felidae	<i>Puma concolor</i>	Onça-parda	RV, AF	VU	VU	LC	2, 3
Carnívora	Felidae	<i>Leopardus pardalis</i>	jaguaririca	AF	VU	VU	LC	3
Carnívora	Procyonidae	<i>Procyon cancrivorus</i>	mão-pelada	AF			LC	2
Artiodactyla	Cervidae	<i>Mazama sp.</i>	veado	RV				1,2
Artiodactyla	Cervidae	<i>Mazama americana</i>	Veado-mateiro	AF	VU		DD	3
Artiodactyla	Cervidae	<i>Mazama gouazoubira</i>	Veado-catingeiro	AF			LC	2
Rodentia	Sciuridae	<i>Guerlinguetus aestuans</i>	caxinguelê	VS, VO				1,3
Rodentia	Erethizontidae	<i>Sphiggurus villosus</i>	ourico	RV			LC	1
Lagomorpha	Leporidae	<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	Tapeti	VS			LC	1

* espécies endêmicas da Mata Atlântica.